

# Respuesta

## Cómo responder a una mordedura de animal

¿Qué debo hacer después de una mordedura de animal?

- **Limpie la herida inmediatamente**, contacte a su médico para ver qué le recomiendan.
- **Identifique** dónde vive el animal o captúrelo de manera segura si es posible.
- Si estuvo expuesto a un murciélago mientras dormía, no lo libere. Captúrelo de manera segura y comuníquese con su departamento de salud local para realizar una prueba.
- Si necesita consultar con el veterinario de Salud Pública del estado de KY, llame al:
- 502-682-4048



# Prevención de mordeduras de animales en el futuro

- Para evitar futuras mordeduras de animales, **nunca intente acariciar a un animal salvaje ni a ningún perro, gato o hurón perdido o desconocido.**
- **Hable con sus hijos sobre el peligro de la rabia** y ayúdeles a comprender por qué deben abstenerse de jugar con animales salvajes o desconocidos.
- **Denuncie cualquier animal salvaje sospechoso** que muestre signos de enfermedad neurológica a un Oficial de Pesca y Vida Silvestre de KY.
- **Asegúrese de que sus mascotas estén al día con la vacuna contra la rabia.**

Para más información visite:

- [https://www.cdc.gov/rabies/medical\\_care/index.html](https://www.cdc.gov/rabies/medical_care/index.html)
- <https://chfs.ky.gov/agencies/dph/dehp/idb/Pages/rabies.aspx>



**Kentucky Public Health**  
Prevent. Promote. Protect.

Me mordió, o al menos creo que me mordió.  
¿Y ahora qué?

Profilaxis después de estar expuesto a la rabia



Ser mordido por un animal puede dar miedo, ¡pero las vacunas actuales son seguras y efectivas!

Primero, si el animal está disponible para pruebas o cuarentena, se pueden evitar las inyecciones. Póngase en contacto con su departamento de salud local para la coordinación.

# Tratamiento

## Tratamiento de la mordedura de un animal para prevenir la rabia

Descarga de responsabilidad: Estas secciones no pretenden proporcionar asesoramiento médico, que debe obtenerse de su médico. Sólo pretenden proporcionar una descripción general del protocolo de profilaxis posterior a la exposición.

La profilaxis posterior a la exposición se compone de dos tipos de inyecciones, una de las cuales la recibirá sólo una vez y la otra la recibirá de cuatro a cinco veces según su función inmunológica. **Siga el cronograma de inyecciones a continuación.**

## Vacunas contra la rabia:

¿Qué es?

- La vacuna contra la rabia es segura y eficaz. Las reacciones adversas son inusuales.

¿Cuántas recibiré?

- Los pacientes generalmente reciben **cuatro vacunas los días 0, 3, 7 y 14**. Es posible que necesite más si lo mordieron en otro país o si está inmunodeprimido.

¿Dónde me inyectarán?

- Los adultos reciben la vacuna en el **músculo deltoides** del brazo. Los niños la recibirán en el deltoides o en el músculo del muslo.

## HRIG:

¿Qué es?

- **La inmunoglobulina humana contra la rabia** le proporciona a su cuerpo anticuerpos protectores inmediatos contra la rabia.

¿Cuántas recibiré?

- Esto se da sólo una vez, cuando comienza la serie.
- Si ha sido vacunado contra la rabia previamente, **¡NO SE RECIBA LA HRIG!**

¿Dónde me inyectarán?

- La inyección se administrará alrededor de la herida de la mordedura o en un músculo grande como el muslo.

## Cronograma de inyecciones

Intervalos entre las inyecciones en **¡ROJO!**

